

生産計画(変更)書 (養液栽培用)

- 1 農産物名 (品種名) イチゴ (紅ほっぺ・紅い零<販売商標:寒紅いちご・ひめ寒紅いちご>)
- 2 栽培区分 県認証農産物 (節減対象農薬3割以上減) 養液栽培
- 3 適用地域 (市町名) 東温市
- 4 作型

月	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
作型														
イチゴ(一般高設栽培)						○		△						
	■												■	

○挿し苗育苗 △定植 □収穫 ■出荷

6 病害虫・雑草防除計画

施用時期		減農薬栽培				散布日	累積 使用 回数	栽培基準に よる農薬使 用成分数 ②	削減率 (1-①/ ②) × 100
		対象病害虫 及び雑草名等	使用農薬名 ①	使用基準	代替技術				
栽培 ステージ	標準 時期								
育苗期	コガネムシ類幼虫	ランネート 4 5 D F	1000倍/移植活 着後(育苗期)/4 回以内/灌注		8/2	1	1		
	ハダニ類		300倍/収穫前日 まで	サンクリスタ ル乳剤	8/17	1			
	炭疽病		2000倍/育苗期 ～収穫前日まで	タフパール	8/23	1			
	炭疽病	バルコート水 和剤	1000倍/育苗期 (定植前)/5回以 内		8/2	1	1		
	ヨトウムシ	アフアーム 乳剤	2000倍/収穫前 日まで/2回以内		7/21	1	1		
	炭疽病	ゲッター水 和剤	1000倍/収穫開 始21日前まで/3 回以内		7/21	1	2		
	アブラムシ類	コルト顆粒 水和剤	3000倍/収穫前 日まで/3回以内		8/9	1	1		
	ハスモンヨトウ	プレバソン フロアブル 5	2000倍/収穫前 日まで/2回以内		9/30	1	1		
	炭疽病	ゲッター水 和剤	1000倍/収穫開 始21日前まで/3 回以内		8/9	2	2		
	炭疽病	バルコート水 和剤	1000倍/育苗期 (定植前)/5回以 内		8/17	2	1		
	炭疽病	ゲッター水 和剤	1000倍/収穫開 始21日前まで/3 回以内		8/30	3	2	2連棟8/27 定植済不散 布	
	イチゴメセンチュウ	ランネート 4 5 D F	1000倍/育苗期/ 散布/4回以内		8/30	2	1	2連棟8/27 定植済不散 布	
	ハダニ類	サンマイト フロアブル	1000倍/収穫開 始3日前まで/1 回以内		10/3	1	1		
	灰色かび病		5000倍/収穫開 始14日前まで/3 回以内	ポリオキシ ンAL水溶剤	10/3	1			
	灰色かび病		1000倍/発病前 ～発病初期	ボトキラー 水和剤	10/3 1	1			
	ハダニ類		300倍/収穫前日 まで	サンクリスタ ル乳剤	10/3 1	2			
ハダニ類		2000倍/収穫前 日まで/2回以内	コロマイト水 和剤	9/21	1				
アブラムシ類	チェス顆粒 水和剤	5000倍/収穫前 日まで/3回以内		9/30	1	1			
計		39 成分				56 成分中 17成分	30.36 %		